



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL



SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

“AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD”

NOTA DE PRENSA N° 03 - 2012-GR.CAJ/GRPPAT/SGAT

Especialista en Meteorología presentó resultados sobre la Caracterización Climática del departamento de Cajamarca



El día jueves 19 de enero del presente año en la sede del Gobierno Regional de Cajamarca, se realizó la presentación de los resultados de la consultoría “Caracterización Climática del departamento de Cajamarca”, exposición a cargo de la Especialista en Meteorología Adelma Bersebha Serpa López, en virtud al compromiso asumido entre el MINAM, SENAMHI y el Gobierno Regional, dicho evento contó con la participación de funcionarios de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Ambiente (RENAMA), la Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial a través del equipo técnico del proceso ZEE - OT y representantes de la sociedad civil vinculados al tema ambiental y cambio climático.

Entre los principales resultados del estudio se destacó lo siguiente:

- ✓ La distribución de la precipitación a nivel multianual señala mayores precipitaciones hacia el norte (zona de la selva) Namballe con 2712.9 mm, otros núcleos en la zona de Granja Porcón (1455.8 mm) y Sayapullo (1434.5 mm).
- ✓ Las precipitaciones durante la ocurrencia de eventos extremos (El Niño 1982-1983 y el Niño 1997-1998) muestran núcleos bien diferenciados de máximas precipitaciones en Sayapullo (5210.3 mm) y Tocmoche (3739.0 mm). Asimismo las precipitaciones aumentan hacia el sur y sur-oeste de Cajamarca y disminuyen hacia la zona central, norte, este y nor-este.



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL



SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

“AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD”

- ✓ Durante la ocurrencia de La Niña 1988-1989 y La Niña 2007-2008 la precipitación no muestra una distribución marcada, pues las precipitaciones se dan de manera más homogénea a nivel de casi toda la región. Los rangos máximos alcanzados están entre 1751.2 mm en Niepos, las precipitaciones disminuyen a lo largo del valle de Jequetepeque, mientras que durante la ocurrencia de El Niño aumentan las precipitaciones.
- ✓ La zona de ocurrencia de heladas se encuentra en la zona comprendida entre Granja Porcón, Cajamarca, Namora y Magdalena, es decir es la zona donde se han registrado temperaturas iguales o menores a 0°C.

Gracias por su difusión

Cajamarca, 24 de Enero del 2012